ПИНОФЕН

КЭ
50 г/л пиноксадена
50 г/л феноксапроп Р этила
70 г/л клоквинтосет-мексила

Primus inter pares
Первый среди равных
ПРИОРИТЕТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА



ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ ГЕРБИЦИД ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ В ПОСЕВАХ ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ

- Полный контроль овсюга, лисохвоста и проса в посевах зерновых
- Высокая эффективность по всему спектру злаковых сорняков
- Высокая селективность к обрабатываемой культуре: повышенное содержание антидота
- Отсутствие ограничений по севообороту
- Подходит для баковых смесей
- Широкое окно применения
- Повышенная устойчивость к осадкам (не смывается через 30–60 минут после обработки)

Гербициды

prioritet-gc.ru

ПРИОРИТЕТ
ГРУППА КОМПАНИЙ
Primus inter pares
Первый среди равных

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА

Регламент применения Пинофена

Норма расхода, л/га (л/т)	Культура	Вредный объект	Способ применения, время обработки, ограничения	Сроки
0,3-0,7	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
0,3-0,7	Ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Гербициды

ГК «Приоритет»
г. Краснодар, ул. Васнецова, 39, этаж 5
тел. 8 (861) 231-55-77, 234-29-62
e-mail: prioritet545@mail.ru