Галмет

КЭ (104 г/л галоксифоп-Р-метила)

Primus inter pares
Первый среди равных
ПРИОРИТЕТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА



ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ, ВКЛЮЧАЯ МНОГОЛЕТНИЕ (ПЫРЕЙ ПОЛЗУЧИЙ) В ПОСЕВАХ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, ПОДСОЛНЕЧНИКА, СОИ, ЛЬНА, РАПСА

- Превращает в труху корневища пырея ползучего
- Отличается высокой селективностью к двудольным культурам
- Эффективно уничтожает самосев зерновых колосовых культур
- Отличается высокой селективностью к двудольным культурам
- Не применять любые граминициды в фазу ВВСН 51 (появление видимых цветочных почек на рапсе)!

prioritet-gc.ru

ПРИОРИТЕТ
Primus inter pares
Первый среди равных
ГРУППА КОМПАНИЙ

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА

Регламент применения Галмета

Норма расхода, л/га (л/т)	Культура	Вредный объект	Способ применения, время обработки, ограничения	Сроки
0,5	Свекла сахарная, подсолнечник, рапс	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
	Свекла кормовая			-(1)
1	Свекла сахарная, подсолнечник, рапс	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий, гумай, свинорой)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
	Лён-долгунец		Опрыскивание посевов при высоте льна 12-18 см в период активного роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

ГК «Приоритет»
г. Краснодар, ул. Васнецова, 39, этаж 5
тел. 8 (861) 231-55-77, 234-29-62
e-mail: prioritet545@mail.ru

Гербициды