Тиальф

200 г/л тиаметоксама
+ 100 г/л альфа-циперметрина

ПРИОРИТЕТ
ГРУППА КОМПАНИЙ
Primus inter pares
Первый среди равных

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА



КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНСЕКТИЦИД ДЛЯ ЛИСТОВЫХ ОБРАБОТОК

Инсектициды

prioritet-gc.ru

ТИАМЕТОКСАМ

- Подавляет колюще-сосущих насекомых
- Эффективен против скрытно-живущих и питающихся на нижней стороне листа вредителей
- Благотворно влияет на ростовые и формо-образовательные процессы, повышает иммунитет растений к неблагоприятным факторам
- Повышает урожайность и улучшает качество продукции
- Нефитотоксичен
- Период защитного действия до 4 недель

АЛЬФА-ЦИПЕРМЕТРИН

- Высокоактивен против абсолютного большинства насекомых-вредителей
- Молниеносное губительное действие на вредителей всех стадий развития, в том числе в жарких условиях
- Легко проникает через покровы насекомых
- Долго сохраняется на обработанных поверхностях

ПРИОРИТЕТ
Primus inter pares Первый среди равных
ГРУППА КОМПАНИЙ

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА

Регламент применения Тиальфа

Норма расхода, л/га (л/т)	Культура	Вредный объект	Способ применения, время обработки, ограничения	Сроки
0,07-0,12	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка. Хлебные жуки, внутристеблевые мухи, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га	40(1)
	Ячмень яровой и озимый	Пьявица, внутристеблевые мухи, злаковые тли		
	Рапс яровой и озимый	Капустная моль, рапсовый цветоед		30(1)
0,1-0,15	Свекла сахарная	Свекловичный долгоносик		
0,1-0,2	Подсолнечник	Луговой мотылёк, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га	40(2)
0,07-0,2	Горчица	Луговой мотылёк, капустная моль, рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)
0,1-0,22	Виноград	Гроздевая листовёртка, трипсы, цикадки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-1000 л/га	30(2)
0,05-0,15	Яблоня	Яблоневый цветоед, яблоневая плодожорка, листовёртки, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-1500 л/га	20(2)
0,05-0,1	Томат открытого грунта	Колорадский жук, тля	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га	20(2)
0,05-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га	20(2)
0,007-0,2	Люцерна, клевер, эспарцет (семенные посевы)	Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылёк, совки, огнёвки, галлицы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га	-(2)
0,07-0,15	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га	-(1)

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных и ручных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата в личных подсобных хозяйствах, авиационным методом и в водоохранной зоне водных обьектов.

Инсектициды

ГК «Приоритет»
г. Краснодар, ул. Васнецова, 39, этаж 5
тел. 8 (861) 231-55-77, 234-29-62
e-mail: prioritet545@mail.ru