Альфацин

КЭ (100 г/л альфа-циперметрина)

Primus inter pares
Первый среди равных
ПРИОРИТЕТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА

ИНСЕКТИЦИД ПРОТИВ ШИРОКОГО СПЕКТРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ



Инсектициды

- Высокоактивен против абсолютного большинства насекомых-вредителей
- Характеризуется молниеносным губительным действием на вредителей, в том числе в жарких условиях
- Эффективен на всех стадиях развития насекомых
- Устойчив к смыванию осадками
- Применяется в малых дозах
- Безопасен для медоносных пчёл, так как обладает репеллентным эффектом

prioritet-gc.ru

ПРИОРИТЕТ
Primus inter pares
Первый среди равных
ГРУППА КОМПАНИЙ

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА

Регламент применения Альфацина

Норма расхода, л/га (л/т)	Культура	Вредный объект	Способ применения, время обработки, ограничения	Сроки
		Для сельскохозяйственного производства		
0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации (озимые обрабатываются весной). Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	38(2)
0,1		Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица		
	Рапс яровой и озимый	Пьявица		
0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	36(2)
0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук		14(2)
0,1	Свекла кормовая	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха		-(2)
	Свекла сахарная			35(2)
	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля		27(1)
0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	-(1)
0,3	Пастбища, участки, заселённые саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 21 дня после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	
		Для личных подсобных хозяйств		
1 мл/100 м^2	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м^2	14(1)
3 мл/100 л	Яблоня	Яблонная плодожорка, листоверка, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	54(2)

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Срок безопасного выхода пользователей на обработанные площади для проведения ручных работ в условиях личных подсобных хозяйств – 3 дня.

Запрещается применение препарата авиационным методом, в водоохранной зоне водных обьектов.

ГК «Приоритет»
г. Краснодар, ул. Васнецова, 39, этаж 5
тел. 8 (861) 231-55-77, 234-29-62
e-mail: prioritet545@mail.ru

Инсектициды