БУРАН

КЭ
66 г/л имазалила
132 г/л прохлораза
56 г/л тритиконазола

ПРИОРИТЕТ
ГРУППА КОМПАНИЙ
Primus inter pares
Первый среди равных

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА



ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ФУНГИЦИД С РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

- Тритиконазол проникает в зерновку при оптимальной влажности, попадает в эмбрион и проводящие системы растения, уничтожая возбудителей головни
- Имазалил быстро перемещается к месту инфекции, защищая растения от прорастания до появления второго междоузлия
- Прохлораз дезинфицирует почву вокруг проростков и способен проникать внутрь семени

Протравители

prioritet-gc.ru

ПРИОРИТЕТ
ГРУППА КОМПАНИЙ
Primus inter pares Первый среди равных

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА

Регламент применения Бурана

Норма расхода, л/га (л/т)	Культура	Вредный объект	Способ применения, время обработки, ограничения	Сроки
0,28-0,32	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня	Обработка семян перед посевомили заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости 10 л/т	-(1)
0,32-0,35		Пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция, мучнистая роса		
0,28-0,32				
		Твердая (каменная) головня		
0,32-0,35	Ячмень яровой и озимый	Пыльная головня, ложная пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция		
0,28-0,35	Рожь озимая	Стеблевая головня, снежная плесень, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян		

Протравители

ГК «Приоритет»
г. Краснодар, ул. Васнецова, 39, этаж 5
тел. 8 (861) 231-55-77, 234-29-62
e-mail: prioritet545@mail.ru