

Экселент

КС (250 г/л пикоксистробина)

Primus inter pares
ПРИОРИТЕТ
Первый среди равных
ГРУППА КОМПАНИЙ

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА

МОЩНЫЙ ФУНГИЦИД ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО И ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ, ЗАЩИЩАЮЩИЙ НОВЫЙ ПРИРОСТ

Фунгициды

УНИКАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ СВОЙСТВ:

- Сочетает активное проникновение в лист, перемещение в паровой фазе, трансламинарное движение и перемещение по ксилеме
- Пикосистробин имеет большую подвижность и способность к перемещению, что в комплексе с другими характеристиками (особенно паровой фазой) значительно отличает его от других ДВ
- Улучшает эффективное использование влаги, усвоение углекислого газа, фотоассимиляцию
- Оптимизирует азотный обмен в растении, замедляет процесс образования этилена (старение растений)
- В результате эффективного контроля болезней и положительного влияния на культуру растёт урожайность и качественные показатели структуры урожая

prioritet-gc.ru

ПРИОРИТЕТ
Primus inter pares
Первый среди равных
ГРУППА КОМПАНИЙ

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА

Регламент применения Экселент

Норма расхода, л/га (л/т)	Культура	Вредный объект	Способ применения, время обработки, ограничения	Сроки
0,5-0,8	Соя	Альтернариоз, фитофтороз, антракноз, аскохитоз, ложная мучнистая роса, септориоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее — при необходимости с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га	40(1-2)
0,4-0,5		Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости — 10 л/т	-(1)
0,5-0,8	Люпин, горох	Альтернариоз, антракноз, аскохитоз, ложная мучнистая роса, септориоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее — при необходимости с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га	39(1-2)
0,4-0,5	Люпин	Серая гниль, фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости — 10 л/т	-(1)
	Горох	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, серая гниль	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости — 5-6 л/т	
0,5	Пшеница яровая, озимая	Ржавчина бурая, мучнистая роса, пиренофороз, септориоз листьев и колоса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – с интервалом 14 дней; против фузариоза колоса - конец колошения — начало цветения. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га	50(2)
0,5	Ячмень яровой и озимый	Тёмно-бурая пятнистость, ржавчина карликовая, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетаций: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га	50(1)
0,5	Подсолнечник	Белая гниль и серая гниль корзинок, сухая ризопусная гниль корзинок, септориоз листьев, фомоз, фомопсис, ржавчина, ложная мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 300-400 л/га	50(1)
	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, склеротиниоз (белая гниль), фомоз	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости — 300 л/га	44(1)
	Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое при появлении первых признаков одного из заболеваний, следующее с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости — 300 л/га	40(2)
0,75	Рис	Пирикуляриоз	Опрыскивание в период вегетации в фазе начала выметывания метелок. Сбор воды с рисовых чеков производится перед уборкой через 30 дней после обработки препаратом. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га	60(1)
0,4-0,5	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариозная стеблевая гниль, гельминтоспориозная стеблевая гниль, плесневение початков	Опрыскивание в период вегетации: видимое образование междоузлий - выбрасывание метёлки – цветение. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га	40(1)
0,8	Сахарная свекла	Ризоктониозная корневая гниль	Опрыскивание в период вегетации в фазе 4-6 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га	50(1)
0,5-0,8	Нут	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при появлении единичных признаков болезни, но не позднее фазы бутонизации, последующее — с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га.	40(2)
	Чечевица	Аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при появлении единичных признаков болезни, но не позднее фазы бутонизации, последующее — с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га.	40(2)

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня. Запрещается применение препарата авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

ГК «Приоритет», г. Краснодар, ул. Васнецова, 39, этаж 5
тел. 8 (861) 231-55-77, 234-29-62, e-mail: prioritet545@mail.ru

Фунгициды