Злакофф

КЭ (240 г/л клетодима)

ПРИОРИТЕТ
ГРУППА КОМПАНИЙ
Primus inter pares
Первый среди равных

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА



СИСТЕМНЫЙ ГЕРБИЦИД С ПОЧВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ

Гербициды

prioritet-gc.ru

ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ СИСТЕМНЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ БОРЬБЫ С ОДНОЛЕТНИМИ И МНОГОЛЕТНИМИ ЗЛАКОВЫМИ СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ ДВУДОЛЬНЫХ КУЛЬТУР

- Уничтожает все виды злаковых сорняков
- Незаменим при использовании против переросших злаковых сорняков и высокой засорённости посевов независимо от стадии развития культуры
- Уничтожает не только надземную часть, но и корневую систему злаковых сорняков
- Обладает быстрым действием и показывает стабильные результаты воздействия независимо от погодных и почвенно-климатических условий
- Не применять любые граминициды в фазу ВВСН 51 (появление видимых цветочных почек на рапсе)!

ПРИОРИТЕТ
Primus inter pares
Первый среди равных
ГРУППА КОМПАНИЙ

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА

Регламент применения Злакофф

Норма расхода, л/га (л/т)	Культура	Вредный объект	Способ применения, время обработки, ограничения	Сроки
0,2-0,4	Свекла сахарная, соя, рапс яровой и озимый, лён-кудряш, подсолнечник (на семена и масло)	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе 2-6 листьев) с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон-99, ВСР (800 г/л неонола $АФ_{9-12}$). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
0,7-1,0		Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон-99, ВСР (800 г/л неонола $АФ_{9-12}$). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
0,2-0,4	Лён-долгунец	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе 2-6 листьев) с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон-99, ВСР (800 г/л неонола $АФ_{9-12}$). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)
0,7-1,0		Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон-99, ВСР (800 г/л неонола $АФ_{9-12}$). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата авиационным методом, в водоохранной зоне водных обьектов, в личных подсобных хозяйствах.

ГК «Приоритет»
г. Краснодар, ул. Васнецова, 39, этаж 5,
тел. 8 (861) 231-55-77, 234-29-62,
e-mail: prioritet545@mail.ru

Гербициды