ФАРНЕЗ

КЭ

220 г/л тебуконазола
80 г/л флутриафола



Фунгициды

primus inter pares
Первый среди равных
ПРИОРИТЕТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФУНГИЦИД СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ

- Быстро проникает в растение и передвигается по тканям акропетально (от основания к верхушке)
- Обладает лечащим действием, искореняя инфекцию на ранней стадии
- Устойчив к смыванию дождём (эффективен даже при осадках через 0,5 часа после обработки)

prioritet-gc.ru

ПРИОРИТЕТ
ГРУППА КОМПАНИЙ
Primus inter pares Первый среди равных

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПОСТАВЩИК СЗР С 2002 ГОДА

Регламент применения Фарнеза

Норма расхода, л/га (л/т)	Культура	Вредный объект	Способ применения, время обработки, ограничения	Сроки
0,5-0,9	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, септориоз, пиренофороз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флагового листа-выдвижение колоса-начало колошения. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га	30(1)
0,9		Болезни колоса (фузариоз, септориоз, чернь)	Опрыскивание в период вегетации в фазы колошение – начало цветения. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га	
0,5-0,9	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ринхоспориоз, полосатая, сетчатая и красно-бурая пятнистости	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флагового листа-выдвижение колоса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	
0,5-0,8	Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы смыкания рядков. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га	
0,7-1,0	Рапс яровой, рапс озимый	Склеротиниоз, альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га	40 (1)
0,25-0,5	Горох	Аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 2-3 недели. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га	40(2)
0,8-1,0	Рис	Пирикуляриоз	Опрыскивание в период вегетации в фазе начала выметывания метелок. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га	60(1)
0,4	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: до цветения, после цветения, ягода размером с крупинку, ягода размером с горошину. Расход рабочей жидкости — 800-1000 л/га	50(4)

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестициды площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Фунгициды

ГК «Приоритет»
г. Краснодар, ул. Васнецова, 39, этаж 5
тел. 8 (861) 231-55-77, 234-29-62
e-mail: prioritet545@mail.ru